ASST Ovest Milanese

SC Gastroenterologia Endoscopia Digestiva

Preparazione alla colonscopia con

SELG ESSE SPLIT

MAC303

Rev1 aprile 2024 Pag. 1 di 1

NEI 2 GIORNI PRECEDENTI L'ESAME



ALIMENTI CONSENTITI

- Pane, pasta, riso, crackers, biscotti, fette biscottate (non integrali)
- Carne e pesce di ogni tipo
- Uova, formaggio, salumi
- Latte e yogurt senza pezzi di frutta
- Brodo, minestra senza verdure, semolino
- Acqua, tisane, thè, caffè, liquidi limpidi, succhi senza polpa né pezzi di frutta

ALIMENTI NON CONSENTITI



- Cibi integrali
- Frutta
- Verdura
- Cereali e semi, frutta secca
- Legumi
- Succhi o yogurt con polpa o pezzi di frutta

IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME	
Colazione	Caffè, thè, miele, biscotti o fette biscottate non integrali, succhi senza polpa né pezzi di frutta
Pranzo	Carne bianca (pollo, tacchino, coniglio), pesce, brodo, pastina, purè, gelato o yogurt senza pezzi di frutta
Cena	Brodo di carne, the, camomilla, tisane e altri liquidi chiari
LA MATTINA DELL'ICAME EINO A CODE DDIMA DELL'ICAME	

LA MATTINA DELL'ESAME FINO A 2 ORE PRIMA DELL'ESAME

Acqua non gasata, thè, tisane, altri liquidi chiari oltre alla preparazione. NON assume cibi solidi.

SELG ESSE (macrogol 4000, simeticone, sodio solfato anidro, sodio bicarbonato, sodio cloruro, potassio cloruro)

Acquistabile in farmacia, la confezione contiene 4 buste uguali da 70 g.

Il giorno precedente l'esame, alle ore 19.30

Sciogliere il contenuto di **2 buste in 2 litri di acqua** non gassata tiepida, mescolare bene finché la polvere si sarà sciolta completamente, lasciare raffreddare e conservare la soluzione in frigorifero. Bere 250 ml di soluzione ogni 15 minuti circa.

È consentita l'assunzione di altri liquidi chiari nel corso della sera.

La mattina dell'esame, 4 ORE prima della colonscopia

Sciogliere il contenuto di **2 buste in 2 litri di acqua** non gassata tiepida, mescolare bene finché la polvere si sarà sciolta completamente, lasciare raffreddare e conservare la soluzione in frigorifero. Bere 250 ml di soluzione ogni 15 minuti circa.

È consentita l'assunzione di altri liquidi chiari fino a due ore prima dell'esame. Non assumere cibi solidi.