#### **ASST Ovest Milanese**

SC Gastroenterologia Endoscopia Digestiva

## Preparazione alla colonscopia con

### **PLENVU**

esame eseguito dopo le ore 15.00

MAC302

Rev1 aprile 2024 Pag. 1 di 1

## **NEI 2 GIORNI PRECEDENTI L'ESAME**



### **ALIMENTI CONSENTITI**

- Pane, pasta, riso, crackers, biscotti, fette biscottate (non integrali)
- Carne e pesce di ogni tipo
- Uova, formaggio, salumi
- Latte e yogurt senza pezzi di frutta
- Brodo, minestra senza verdure, semolino
- Acqua, tisane, thè, caffè, liquidi limpidi, succhi senza polpa né pezzi di frutta

## **ALIMENTI NON CONSENTITI**



- Cibi integrali
- Frutta
- Verdura
- •Cereali e semi, frutta secca
- Legumi
- •Succhi o yogurt con polpa o pezzi di frutta

IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME	
Colazione	Caffè, thè, miele, biscotti o fette biscottate non integrali, succhi senza polpa né pezzi di frutta
Pranzo	Carne bianca (pollo, tacchino, coniglio), pesce, brodo, pastina, purè, gelato o yogurt senza pezzi di frutta
Cena	Brodo di carne, the, camomilla, tisane e altri liquidi chiari
LA MATTINA	A DELL'ESAME FINO A 2 ORE PRIMA DELL'ESAME
Acqua non gas	sata, thè, tisane, altri liquidi chiari oltre alla preparazione. NON assume cibi solidi.

# PLENVU (macrogol 3350, sodio ascorbato, sodio solfato anidro, acido ascorbico, sodio cloruro e potassio cloruro)

### NON INDICATO IN CASO DI FAVISMO, FENILCHETONURIA, INSUFFICIENZA RENALE SEVERA

Acquistabile in farmacia, la confezione contiene:

Dose 1: una bustina singola

**Dose 2**: due bustine diverse, A e B, incollate tra di loro (da utilizzarsi insieme).

## La mattina dell'esame, alle ore 06.30

Sciogliere il contenuto della busta **DOSE 1** in **1/2 LITRO** (500ml) **di acqua**, mescolando fino al completo scioglimento (può richiedere qualche minuto). Raffreddare in frigorifero. Bere lentamente in circa mezz'ora il preparato ottenuto (1/2 bicchiere ogni 10 minuti). Entro le 08.00 bere **almeno un ulteriore 1/2 LITRO** (500ml) di ACQUA o LIQUIDI CHIARI (thè, camomilla) lentamente. È consentita l'assunzione di altri liquidi chiari nel corso della mattina.

## La mattina dell'esame, 4 ORE prima della colonscopia

Sciogliere il contenuto delle 2 buste A e B insieme, in 1/2 LITRO (500 ml) di acqua, mescolando fino a completo scioglimento (richiede qualche minuto). Raffreddare in frigorifero. Bere lentamente il preparato ottenuto + ½ litro di acqua in circa 1 ora (1 bicchiere di preparato alternato ad 1 bicchiere di acqua). È consentita l'assunzione di altri liquidi chiari sino a due ore prima dell'esame. Non assumere cibi solidi.